



Clinique Equine de Meslay

8 rue de l'hippodrome - 53170 MESLAY DU MAINE
- France

Tél : +33 (0) 2 43 98 41 16 - fax : +33 (0) 9 70 06 26 19
clinique-equine-accueil@orange.fr - www.cliniqueequinedemeslay.com

Dr Gilles BARATOUX
DMV – n° Ordre 12690

Dr Jean-Christophe BAYLE
DMV – n° Ordre 20369

Dr Marc de BEAUDRAP
DMV – n° Ordre 20708

Dr Tamara de BEAUREGARD
Spécialiste en Chirurgie Equine
Dipl. de l'ECVS – n° Ordre 18823

Dr Richard CORVELLER
DMV – n° Ordre 14431

Dr Stéphane CUIILLER
DMV – n° Ordre 23164

Dr Benoit GABEUR
DMV – n° Ordre 9610

Dr Nicolas DESMARRES
DMV – n° Ordre 22196

Dr Lena LOMBAERS
DMV – n° Ordre 32456

Dr Sebastia SUREDA
DMV – n° Ordre 34609

Meslay du Maine, le 30/09/2022

CHIRURGIE : VALGUS DU CARPE AD ET EXOROTATION AD

N21 VENITIEUNE

S. KELLYS

Anamnèse

Le poulain est présenté à la clinique le 04/03/2021 pour une déviation valgus du carpe D avec exorotation du membre droit.

Examen clinique

Le 04/03, le poulain présente une déformation angulaire sur les jambes AD.
Examen clinique à l'examen pre-anaesthetic est normale.

Chirurgie

Le 05/03/2021, sous anesthésie générale, décubitus dorsal :
Une vis (transphyseal screw) est mise sur le carpe D, en face médial. Une chaussure dalmer (extension medial) est mise au pied AD.
Les incisions sont suturé avec du fil résorbable (Vicryl 0)

Traitement à la maison

Le poulain est envoyé à la maison avec des antibiotiques (Cortexiline – 8 ml IM) pendant 3 jours et des anti-inflammatoires (Meloxicam - 3 ml PO) pendant 1 jour. Bandages sont mis sur la jambe pendant 15 jours.

Le 26/04/2021

Anamnèse

Le poulain est présenté à la clinique pour un retrait de vis suite à une déformation angulaire valgus du carpe antérieur droit avec exorotation.



Clinique Equine de Meslay

8 rue de l'hippodrome - 53170 MESLAY DU MAINE
- France

Tél : +33 (0) 2 43 98 41 16 - fax : +33 (0) 9 70 06 26 19
clinique-equine-accueil@orange.fr - www.cliniqueequinedemeslay.com

Chirurgie

Le 27/04/2021, sous anesthésie générale, décubitus dorsal :

La vis (transphyseal screw) en face médial du carpe D est retirée et l'incision suturée avec du fil résorbable (Vicryl – 0)

.

Traitement à la maison

Le poulain est envoyé à la maison avec des antibiotiques (Cortexiline – 12 ml IM) pendant 2 jours.
Un bandage est mis sur la jambe AD pendant 10 jours.

Le bandage de la plaie abdominal est retiré après 48 h, et les fils attache sont coupé.

Dr Tamara de BEAUREGARD

Diplômée de l'ECVS – Spécialiste en chirurgie Equine
tamara.debeauregard@gmail.com